




LISA 2. Saasteainete hajumiskaardid. Puiga katlamaja




Joonis L2.1. Vääveldioksiidi hajumise tunnikeskmised maapinnalähedased kontsentratsioonid vastavalt lisatud värviskaalale. Maksimaalne kontsentratsioon 0,234 $\mu\text{g}/\text{m}^3$




Joonis L2.2. Lämmastikoksiidide hajumise tunnikeskmised maapinnalähedased kontsentratsioonid vastavalt lisatud värviskaalale. Maksimaalne kontsentratsioon 2,510 $\mu\text{g}/\text{m}^3$



Joonis L2.3. Süsinikoksiidi hajumise kaheksa tunni keskmised maapinnalähedased kontsentratsioonid vastavalt lisatud värviskaalale. Maksimaalne kontsentratsioon 28,603 µg/m³



Joonis L2.4. Tahkete osakeste (PM-sum) hajumise tunnikeskmised maapinnalähedased kontsentratsioonid vastavalt lisatud värviskaalale. Maksimaalne kontsentratsioon 7,492 µg/m³



Joonis L2.5. Lenduvate orgaaniliste ühendite hajumise tunnikeskmised maapinnalähedased kontsentratsioonid vastavalt lisatud värviskaalale. Maksimaalne kontsentratsioon 1,411 $\mu\text{g}/\text{m}^3$